

「家」多點守護-家長網上工作坊

第三節

註冊臨床心理學家

「家」多點守護-家長網上工作坊目標

第一節

- 子女的成長發展階段及需關注的地方
- 家庭在子女情緒/精神健康發展上的重要角色

第二節

- 如何與子女「共情」
- 與子女建立有效的溝通模式
- 子女面對的情緒 / 精神健康挑戰

第三節

- 認識精神健康
- 認識精神健康問題的徵兆和警號
- 以實證為本的策略支援有情緒 / 精神健康困擾的子女
- 「幫人先幫自己」 - 如何自我關顧

第四節

- 學童自殺問題及介入策略
- 專業人士的介入角色及家校合作的重要性
- 社區資源介紹
- 重點總結

家長在子女成長的角色任務

良好的
關係

提升對子女
的影響力

健康的家庭

減少家庭帶
來的情緒和
壓力

合理的
期望

理解子女的
發展階段和
需要

積極的
合作

尋求學校和
社區支援

OI

抑鬱 與 抑鬱症

Unhappy



情緒低落 VS 抑鬱症

例子分享

兒童 / 青少年抑鬱情況

01

- 香港救助兒童會於2020年刊登研究結果：
 - 51% 中學生及 30% 小學生顯示抑鬱及焦慮症狀

02

- MINDHK:
 - 兒童及青少年精神科病患從2011/12 年至2015/16 年間上升50%。
 - 51.5% 中學生出現抑鬱症症狀，25% 顯示臨床顯著高度焦慮。
 - 75% 精神健康問題會在24歲之前開始出現，因此為高危青年提供協助是最有效預防精神健康問題的方法。

抑鬱的症狀

- 連續 **2星期** 出現下列 **5項**或以上症狀
(包括首兩項)

自殺念頭

缺乏動力

覺得自己一事無成 或充滿內疚感

大幅度體重改變



1. 情緒低落

2. 對事物失去興趣
或無法享受

難以集中精神
決斷力下降

失眠或過多睡眠

反應遲緩或
激動不安

兒童及青少年抑鬱時的 常見行為表現

- 申訴疲累，即使比平時睡得更多
- 忘記或不願動手做家務
- 長時間逗留在房間內，逃避接觸
- 脾氣轉差，容易與同學及家人發生爭執和衝突
- 學業成績退步及功課表現差
- 缺課
- 減少和朋友接觸及參與活動
- 以吸煙、酒精或藥物去處理情緒困擾
- 可能出現自我傷害問題

Pediatric Symptom Checklist-17

NEVER = 沒有 = 沒有時間或很少注意到。

SOMETIMES = 有時 = 有時注意到。

OFTEN = 時常 = 很常見到，感到擔心／擔憂。

	Never 沒有	Sometimes 有時	Often 時常
Fidgety, unable to sit still 煩燥的，不能坐定	0	1	2
Feels sad, unhappy 感覺悲哀，不快樂	0	1	2
Daydreams too much 太多白日夢（幻想）	0	1	2
Refuses to share 拒絕分享	0	1	2
Does not understand other people's feelings 不明白他人的感覺	0	1	2
Feels hopeless 感覺無希望	0	1	2
Has trouble concentrating 難於集中精神 / 注意力	0	1	2
Fights with other children 和其他孩子打架	0	1	2

©1988, M Jellinek & JM Murphy, Massachusetts General Hospital (PSC-17 created by W. Gardner & K. Kelleher)
Chinese translation courtesy of Gouverneur Healthcare Services, NYC

NEVER = 沒有 = 沒有時間或很少注意到。

SOMETIMES = 有時 = 有時注意到。

OFTEN = 時常 = 很常見到，感到擔心／擔憂。

	Never 沒有	Sometimes 有時	Often 時常
--	-------------	-----------------	-------------

Is down on him or herself 看不起自己

0	1	2
---	---	---

● Blames others for his or her troubles 因自己的煩擾而責備他人

0	1	2
---	---	---

Seems to be having less fun 似乎興緻樂趣不多

0	1	2
---	---	---

● Does not listen to rules 不遵守規例

0	1	2
---	---	---

❖ Acts as if driven by a motor 太愛動 / 不停活動

0	1	2
---	---	---

● Teases others 取笑他人

0	1	2
---	---	---

Worries a lot 太多憂慮

0	1	2
---	---	---

● Takes things that do not belong to him or her 拿取不屬於自己的東西

0	1	2
---	---	---

❖ Distracted easily 容易分心

0	1	2
---	---	---

O2

焦慮 與 焦慮症

- 廣泛性焦慮症
(Generalized Anxiety Disorder)
- 社交焦慮症(Social Anxiety Disorder)
- 驚恐症 (Panic Disorder)
- 恐懼症 (Specific Phobia)
- 分離焦慮症 (Separation Anxiety Disorder)
- 選擇性緘默症
(Selective Mutism)



焦慮症的 成因

- 每 100 名學生約有 8 至 10 人；女性較多
- 生理因素：遺傳、神經傳遞質
- 心理因素：
 - 個人的思想模式和經歷
 - 完美主義思想
 - 害怕犯錯
 - 對學業或朋輩關係有過高期望等

焦慮症狀

情緒方面	生理方面	認知方面	行為方面
擔心	心跳加速	難以集中精神	坐立不安
緊張	呼吸短促	記憶力下降	情緒容易暴躁
暴躁	肌肉繃緊	追求完美	逃避困難的事情
	頭痛	放大危險線索	懼怕失敗
	腸胃不適	頭腦一片空白	畏縮
	睡眠問題		對一些小事的反應過敏

抑鬱 / 焦慮背後

- 亞氏保加症
- 讀寫障礙症
- 智力偏低

- 朋輩關係
- 欺凌
- 家庭問題

臨床個案分享

03

自我傷害行為

自我傷害行為

常見的自我傷害行為包括：

故意割傷或刺傷皮膚	撞頭或把身體撞向硬物
掐傷自己	拳打物件
抓傷自己	將物件（如釘和針）藏在皮膚下
咬自己	阻止傷口癒合或拒絕接受治療
灼傷部分皮膚	攝入軟性毒品或酒精
剝脫皮膚或扯出毛髮	

Source: EDB


自傷行為的徵兆



- 情緒出現變化，或睡眠或飲食模式有改變



- 行為隱秘，如不尋常地長時間閉門待在浴室或房間



- 社交退縮，與朋友和家人
的關係疏離



- 身上有無法解釋的割痕、
瘀傷或燒傷的痕跡



- 藏有利器，如剃刀片、鏟刀等



- 拒絕參與需要更換衣服或穿著
短袖衫的活動



- 衣著打扮與天氣不符，如
天氣炎熱仍然穿上長袖衫
或長褲，刻意遮掩手臂或
腿部

Source: EDB

青少年自傷行為情況

- 盛行率 15% -32.7%
- 女孩多於男孩
- 三種常見形式
 - 抓傷
 - 阻止傷口癒合
 - 割腕

- 性別差異
 - 女性：割腕
 - 男性：阻止傷口癒合
- 與自殺行為增加有關

Source: Siu (2019)
Cheung, Wong, Lee, Lam, Fan & Yip (2013)

04

實證為本的策 略支援子女

「我唔想返學」

抑鬱症例子

當子女有情緒 問題時.....

- 先右後左
- 「你不是你的子
女」 - 同理心 +
注意溝通的路障
- 預備情緒支援資
源

問題為本、解決問題

- 釐清所面對的問題
- 列出解決問題的方法
- 評估每個方法的好與壞
- 選擇合適的方法
- 實行
- 評估效果及反思


提示：

- 如問題太複雜，建議把問題拆件處理
- 與子女共同協作，使他們實行自己的協定

當子女有 情緒問題時

- 調整期望至合理水平
- 跳出思想牛角尖（如：災難化思想、妄下判斷）
- 建立家庭、社交支援網絡
- 不被情緒主導行為
- 維持健康的生活習慣
- 有需要時尋求專業人士的幫助


認知行為治療方案



跳出思想牛角尖

辨識思想
及情緒

- 我當下的情緒是?
- 我正在想什麼?




核對事實

- 我的想法是事實嗎?
- 有沒有思想陷阱?



想出其他
可能性

- 其他人會怎樣想?
- 如果真的發生了, 我有什麼解決方法?



靜觀

- 「被思想拉扯」的例子
- 靜觀如何幫助？

靜觀資源



三步呼吸空間 - 應變




靜觀呼吸空間 - 平常



十分鐘靜坐修習（廣
東話）

與人聯繫

- 研究發現良好的人際關係 (Positive relations with others) 是促進健康心理的關鍵之一：
- 與他人有溫情、滿足，及信任的關係；
- 關注他人福祉；能夠表現出高度的同理心、情感，及親密度；
- 明白人際關係裡的付出與接受



保持健康身體

恆常運動

持續性的運動
循序漸進

均衡飲食



健康身體

良好的睡眠習慣

作息定時
避免午睡
睡前準備

培養興趣

做感興趣的事
與朋友一起做
善用社區資源

Relaxation Exercise

放鬆運動



腹式呼吸法



意象鬆弛法



漸進式肌肉鬆弛法